

**ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОГО
РАСПРОСТРАНЕНИЯ 21.08.2024**

КОМУ: Grant Co. Media & Grant Co.
Healthcare Community.

**ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ
ОБРАЩАЙТЕСЬ:**

Лекси Смит
Сотрудник по вопросам общественной
информации
(509) 770-4194
Lsmith@granthealth.org

Эмбер МакКой
Менеджер по расследованиям и мерам
реагирования
509-766-7960 ДОБ. 14
amccooy@granthealth.org

Коклюш: Опасный рост числа случаев заражения в округе Грант

ОКРУГ ГРАНТ, ШТАТ ВАШИНГТОН – Персонал Управления здравоохранения округа Грант (GCHD, Grant County Health District) принимает меры реагирования в связи со значительным увеличением числа случаев заболевания спазматическим кашлем (коклюшем) в округе Грант. В настоящее время зарегистрировано 21 человек с подтвержденным диагнозом коклюша и ещё 7 человек с характерными симптомами этого заболевания, которые, вероятнее всего, инфицированы, и так или иначе связаны с этими выявленными случаями заражения. До того, как в июне месяце текущего года появились первые сообщения о распространении коклюша, последний подтвержденный случай этого заболевания в округе Грант был зарегистрирован в 2019 году. Аналогичный рост заболеваемости коклюшем был зафиксирован и в масштабах всего штата Вашингтон.

Вакцинация от коклюша – это наиболее эффективная мера защиты от инфекции, имеющаяся в нашем распоряжении в настоящее время. Специалисты Управления GCHD настоятельно рекомендует вам сделать прививку от коклюша – если вы по каким-либо причинам пропустили срок плановой прививки – и оставаться дома, если вы заболели.

Управление GCHD просит медицинских работников учитывать вероятность того, что у любого пациента с характерными признаками этой болезни может оказаться коклюш, и немедленно уведомлять GCHD о подозрении на инфекцию. Свяжитесь с GCHD по телефону (509) 766-7960.

Текущая ситуация по состоянию на 21.08.2024:

- 22 из 28 случаев заражения могут быть связаны со славянскими церквями в Мозес-Лейк и Соуп-Лейк.
- 22 из 28 случаев заражения произошли в районе Мозес-Лейк.
- Как минимум 23 из 28 выявленных случаев заражения зарегистрированы среди людей в возрасте 16 лет и младше.
- Как минимум 27 из 28 заболевших не были вакцинированы или пропустили сроки плановых прививок.
- В округе Грант, вероятнее всего, фактическое количество случаев заражения коклюшем больше, чем то, которое было зарегистрировано.

В округе были приняты незамедлительные меры с целью уведомления других людей, которые, возможно, контактировали с заразившимися лицами. GCHD продолжает сотрудничать со славянской общиной, предоставляя рекомендации и обновлённую информацию о сложившейся ситуации.

О коклюше (спазматическом кашле): Коклюш – это серьезное и очень заразное инфекционное заболевание, которое может быть особенно опасным для детей грудного возраста. В основном оно передается при кашле или чихании.

Симптомы коклюша: Симптомы коклюша обычно развиваются в течение 5-10 дней, но могут проявляться и в течение 3 недель после заражения.

Ранние симптомы могут продолжаться в течение 1-2 недель и включают в себя:

- Насморк
- Слегка повышенная температура
- Лёгкий, периодический кашель
- Апноэ – Кратковременная задержка дыхания (у детей грудного возраста)

Поздние симптомы могут проявиться через 1-2 недели после заражения. Эти симптомы являются более традиционными признаками коклюша и включают:

- Частые спазматические приступы кашля, сопровождающиеся резким свистящим вдохом
- Рвота во время приступов кашля или после них
- Изнеможение после приступов кашля

Если вы подверглись контакту с больным коклюшем:

Наилучшим способом узнать, заболели ли вы коклюшем, является консультация с вашим лечащим врачом. Если вы подверглись воздействию возбудителей коклюша, или если у вас имеются симптомы этого заболевания, позвоните в клинику, прежде чем прийти на приём. При личном посещении надевайте маску и следуйте другим инструкциям клиники.

Некоторым людям, находившимся в близком контакте с больным коклюшем, следует принимать антибиотики, чтобы не заболеть. Держитесь подальше от других людей, пока не пройдут первые 5 дней лечения.

Вакцинация от коклюша:

В настоящее время имеются два типа вакцин, защищающих от коклюша:

- DTap предназначена для детей грудного возраста и младше семи лет.
- Tdap предназначена для детей в возрасте от семи лет и старше, подростков и взрослых (включая беременных).
 - **Беременным** требуется прививка вакциной Tdap при каждой беременности.
 - Если вы были вакцинированы в подростковом возрасте (11 лет и старше), вам не требуется дополнительная доза во взрослом возрасте, если только вы не беременны.

Если вы заболели, важно также часто мыть руки, прикрывать рот при кашле и оставаться дома.

Группы повышенного риска:

Вакцинация против коклюша защищает и вас, и тех, кто наиболее уязвим для тяжёлых форм заболевания. К группам повышенного риска развития коклюша относятся:

- Младенцы в возрасте до одного года
- Беременные (в особенности в третьем триместре беременности)
- Люди, страдающие хроническими респираторными заболеваниями

Лечение:

Коклюш можно лечить с помощью антибиотиков. Важно начать лечение как можно раньше, чтобы предотвратить распространение болезни на других людей. Своевременное лечение также может ускорить исчезновение симптомов и облегчить их.

Если вам назначены антибиотики от коклюша, вы должны полностью пройти курс лечения и принять все прописанное лекарство до конца, в соответствии с указаниями вашего лечащего врача. Без назначения врача антибиотики принимать не рекомендуется.

Для получения более подробной информации:

Защитите свою семью от коклюша – [Английский](#) | [Русский](#) | [Украинский](#) | [Испанский](#)
