

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA 8/21/2024	PARA OBTENER INFORMACIÓN, CONTACTE A
PARA: Grant Co. Media & Grant Co. Healthcare Community.	Lexi Smith Funcionario de información pública (509) 770-4194 Lsmith@granthealth.org Amber McCoy Gerente de investigaciones y respuesta 509-766-7960 EXT. 14 amccoy@granthealth.org

Tos ferina: Un preocupante aumento de infecciones en el condado de Grant

CONDADO DE GRANT, WA – El personal del Distrito de Salud del condado de Grant (GCHD, por sus siglas en inglés) está respondiendo a un aumento significativo de los casos de tos ferina (pertussis) en el condado de Grant. Actualmente hay 21 personas con un diagnóstico de tos ferina confirmado y otras 7 que muestran síntomas, quienes probablemente estén infectadas y relacionadas con estos casos. Antes de que se informara sobre los primeros casos de pertussis en junio de este año, el último caso confirmado del condado de Grant ocurrió en el año 2019. Se ha reportado un aumento similar de infecciones por tos ferina en todo el estado de Washington.

La mejor protección que tenemos contra la infección es la vacuna contra la tos ferina. El GCHD le recomienda con sentido urgencia que se aplique la vacuna contra la tos ferina si usted no tiene al día su vacunación y que se quede en casa si se encuentra enfermo.

El GCHD solicita que los proveedores de atención médica consideren que cualquier paciente que presente síntomas tiene la posibilidad de tener la infección por tos ferina y se les pide que notifiquen de manera inmediata al GCHD sobre cualquier sospecha de infección. Pueden comunicarse con el GCHD llamando al teléfono (509) 766-7960.

Situación actual al 21 de agosto de 2024:

- 22 de las 28 infecciones pueden ser relacionadas con iglesias esclavas en Moses Lake y Soap Lake.
- 22 de las 28 infecciones ocurrieron en el área de Moses Lake.
- Al menos 22 de las 28 infecciones ocurrieron en personas con edades de 16 años o menos.
- Al menos 27 de las 28 personas enfermas no estaban vacunadas o no tenían al día su vacunación.

Es probable que haya más infecciones de tos ferina en el condado de Grant que las que han sido reportadas.

Se ha tomado acción inmediata para notificar a quienes pudieran haber estado en contacto con estos individuos. El GCHD continúa trabajando con la comunidad esclava para proporcionar recomendaciones e información acerca de la situación.

Acerca de la tos ferina:

La tos ferina es una infección grave y altamente contagiosa, la cual puede ser especialmente peligrosa para los bebés. Su principal transmisión ocurre a través de la tos o los estornudos.

Síntomas de la tos ferina:

Los síntomas de la tos ferina por lo general se presentan dentro de 5 y 10 días después de la exposición, pero pueden presentarse hasta 3 semanas después de esta.

Los síntomas iniciales pueden durar de 1 a 2 semanas y por lo general incluyen:

- Secreción nasal
- Tos leve ocasional
- Fiebre leve
- Apnea -una pausa en la respiración (en los bebés)

Los síntomas posteriores pueden presentarse después de 1 a 2 semanas de que ocurrió la infección.

Estos son los síntomas más tradicionales de la tos ferina e incluyen:

- Episodios rápidos y numerosos de tos seguidos de un silbido agudo
- Agotamiento después de los episodios de tos
- Vómito durante o después de los ataques de tos

Exposición a la tos ferina:

La mejor manera de saber si usted tiene tos ferina es consultar con su proveedor de atención médica. Si usted ha tenido exposición a la tos ferina o presenta síntomas, llame a la clínica antes de acudir a una consulta. Utilice una mascarilla y siga todas las instrucciones adicionales de la clínica cuando acuda a la consulta en persona.

Algunas personas deben recibir antibióticos para prevenir que se enfermen si han estado cerca de alguien con tos ferina. Se debe mantener lejos de otras personas hasta que haya completado los primeros 5 días de tratamiento.

Vacunación contra la tos ferina:

Existen dos vacunas que protegen contra la tos ferina:

- DTaP es para bebés y niños menores de siete años.



- Tdap es para niños de siete años o más, adolescentes y adultos (incluyendo a las personas embarazadas)
 - [Las personas embarazadas](#) necesitan la vacuna Tdap en cada embarazo.
 - Si a usted le aplicaron la vacuna cuando era adolescente (11 años o más), no necesita una dosis adicional en la edad adulta a menos que esté embarazada.

También es importante lavarse las manos, cubrirse la boca al toser y quedarse en casa cuando se tiene la enfermedad.

Grupos de alto riesgo:

La vacuna contra la tos ferina le da protección a usted y a las personas más vulnerables para evitar contraer una enfermedad grave. Los grupos con mayor riesgo de contraer la tos ferina incluyen a:

- Bebés menores de un año de edad
- Personas embarazadas (especialmente en el tercer trimestre)
- Personas que padecen enfermedades respiratorias crónicas

Tratamiento:

La tos ferina puede tratarse con antibióticos. Es importante comenzar el tratamiento tan pronto como sea posible para evitar la propagación de la enfermedad a otras personas. Proporcionar tratamiento al inicio de la enfermedad también puede hacer que los síntomas desaparezcan más pronto y sean menos graves.

Si le recetan antibióticos para la tos ferina, usted deberá terminar el tratamiento completo según las indicaciones de su médico. Los antibióticos no están recomendados para el público en general.

Para obtener más información:

Proteja a su familia de la tos ferina – [Inglés](#) | [Ruso](#) | [Ucraniano](#) | [Español](#)